

GARANTOVANÝ AUTODIDAKTICKÝ TEST

s akreditáciou SACCME

Garantovaný autodidaktický test je oficiálna vzdelávacia aktivita. Slovenská akreditačná rada pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (SACCME) udeľuje až 2 kredity za jeden test.

Trvanie vzdelávacej aktivity „autodidaktický test“:

- Testy distribuované prostredníctvom časopisu Súčasná klinická prax 2014/1 (ISSN 1214–7036) možno riešiť **od 20. marca do 20. mája 2014.**
- Certifikáty s udeleným počtom kreditov budú riešiteľom zaslané do 16. septembra 2014.

Ohodnotenie testu:

- 80–100% úspešnosť riešenia 2 kredity
- 60–79% úspešnosť riešenia 1 kredit
- menej ako 59% úspešnosť 0 kreditov

Informácia pre lekárnika!

Na základe platných pokynov Slovenskej lekárskej komory, je test možné vyplniť len elektronicky na stránke education.adcc.sk pod názvom „Súčasná klinická prax 2014/1“. V prípade, ak autodidaktický test na internete riešite po prvýkrát, na začiatku je potrebné zaregistrovať sa. Akékoľvek otázky konzultujte na adrese info@pharminfo.sk.

Autodidaktický test je možné riešiť od 20. 3. 2014. Potvrdenie o úspešnom absolvovaní testu Vám bude zaslané automaticky na Vami zadanú emailovú adresu.

Testové otázky k článkom zverejneným v časopise:

SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX 2014/1

Označte správnu odpoveď/správne odpovede

1. Odhaduje sa, že výskyt prediabetu v Európe predstavuje:

- a) 5 %
- b) 10 %
- c) 11–12 %
- d) 15 %

2. Definícia prediabetu podľa WHO zahrňuje abnormálne hodnoty:

- a) IFG
- b) IGT
- c) HbA_{1c}
- d) všetky z uvedených

3. Iba male percento populácie vo svete je zdravé, bez rizika kardiovaskulárnych ochorení. Odhaduje sa na:

- a) 1 %
- b) 5 %
- c) 10 %
- d) 15 %

4. Abdominálna obezita je markerom:

- a) dysfunkčného tukového tkaniva
- b) abnormálnej imunologickej odpovede

- c) zápalu
- d) všetkých z uvedených

5. Artériovú trombózu môže/môžu spôsobiť:

- a) vrodená endotelová dysfunkcia
- b) primárna endotelová dysfunkcia
- c) žiadna z uvedených možností
- d) všetky typy a druhy endotelovej dysfunkcie

6. K orgánovovaskulárnym artériovým ischemickým chorobám patria pri diabetes mellitus:

- a) iba kardiovaskulárne artériové choroby
- b) iba kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne artériové choroby
- c) iba kardiovaskulárne a extremitovaskulárne artériové choroby
- d) všetky uvedené a ďalšie orgánovovaskulárne artériové choroby

7. Medzi inhibítory cyklooxygenázy nepatrí antitrombocytové antitrombotikum:

- a) klopidoogrel
- b) indobufen
- c) sulfipyrazón
- d) kyselina acetylsalicylová

8. Klasické antagonisty receptorov GPIIb/IIIa sa podávajú:

- a) iba perorálne
- b) perorálne a parenterálne
- c) subkutánne
- d) intravenózne

9. Medzi nové antagonisty ADP receptorov P2Y₁₂ patrí:

- a) ticagrelor
- b) tirofiban
- c) eptifibatid
- d) abciximab

10. Aké sú najtypickejšie prejavy deficitu Zn²⁺ v celom ľudskom organizme?

- a) spomalenie rastu u detí
- b) hypogonadizmom u mužov

- c) poruchami vnímania chuti (dysgeusia)
- d) časté infekcie pri poruche bunkovej imunity
- e) a–d je správne

11. Aké sú najčastejšie kožné prejavy deficitu Zn^{2+} ?

- a) suchosť kože
- b) alopecia
- c) spomalené hojenie rán
- d) erytrodermia
- e) a–c je správne

12. Ktoré sú najčastejšie indikácie suplementácie zinku v dermatológii?

- a) alopecia
- b) acne vulgaris
- c) hojenie kožných defektov rôznej etiológie
- d) hidradenitis suppurativa
- e) a–d je správne

13. Akým mechanizmom ovplyvňuje stres úroveň hladiny magnézia?

- a) stresové hormóny zvyšujú vylučovanie Mg obličkami
- b) stresové hormóny zvyšujú ukladanie Mg do kostí
- c) stresové hormóny znižujú absorpciu Mg z tráviaceho traktu

14. Čo je charakteristické pre latentnú tetániu?

- a) pocit zvýšeného svalového napätia, zvýšený sklon ku kŕčom, bolesti hlavy, pocit nevoľnosti, celková slabosť, únava
- b) náhle nekoordinované pohyby rôznych častí tela, zdanie rozličných pachov, chutí, pocitov, vizuálne halucinácie
- c) patologický nález pri vyšetrení mozgu magnetickou rezonanciou

15. Aká je odporúčaná denná dávka pre liečbu tetánie, migrény a tenznej bolesti hlavy?

- a) 33–250 mg elementárneho Mg počas dvoch mesiacov
- b) 500 mg elementárneho Mg minimálne počas 12 mesiacov
- c) 200–600 mg elementárneho Mg počas 3–6 mesiacov

16. Priemerná dávka metformínu v štúdií UKPDS bola:

- a) 2 000 mg
- b) 1 700 mg
- c) 2 550 mg
- d) 2 300 mg

17. Medzi paraglykemické efekty metformínu patrí:

- a) pozitívny vplyv na endoteliálnu dysfunkciu

- b) priaznivý efekt na prokoagulačný stav
- c) vedie k miernemu zníženiu hladín celkového a LDL cholesterolu
- d) všetky tri odpovede sú správne

18. Medzi perorálne antidiabetiká s dokázaným protektívnym vplyvom na kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu diabetikov patria:

- a) deriváty sulfonylurey
- b) metformín
- c) GLP-1 agonisty
- d) žiadne perorálne antidiabetikum nemá dokázaný protektívny vplyv na kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu

19. Ochorenie beri-beri je spojené s nedostatkom vitamínu:

- a) B1
- b) B12
- c) B8
- d) B1 a B6, ale len u mužov ázijskej rasy

20. Klinické výhody benfotiamínu, ako v tuku rozpustnom vit. B1, spočívajú v:

- a) kumulácii v tukovom tkanive ako zásoba pre obdobie s nižším príjmom B1
- b) lepšej biologickej dostupnosti a tým vyššej účinnosti
- c) inaktivácii 5-fluorouracilu
- d) všetky tri odpovede sú správne